

# КЛЕШЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ

## УСЛОВИЯ ЗАРАЖЕНИЯ

- Посещение леса**
  - Клещ сидит на травинках или деревьях.
  - Не может летать или прыгать.
  - Может цепляться за жертву.
  - Может укусить на ходу.
- Занесение клещей животными** собаками и кошками после прогулки.
- Занесение клещей людьми** на одежде, с цветами, дачными походами.



## СПОСОБЫ ЗАРАЖЕНИЯ

- Укус клеща.
- Раздавленные и впитанные персиковый сок клеща.
- Употребление в пищу инфицированного сырого козьего и коровьего молока.



## ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ

- Носите в лесу специальную одежду**
  - Куртку или рубашку с длинным рукавом, с плотно застегнутыми карманами и манжетами.
  - Головной убор.
  - Высокая закрытая обувь, в которую можно заправить штаны.
- Используйте репелленты** обрабатывайте одежду и открытые участки тела специальными защитными препаратами.
- Осматривайте себя** не пренебрегайте само- и взаимосомотром на прогулке и по возвращении домой.
- Пейте кипяченое молоко**
- Сделайте прививку против клещевого энцефалита!**



## ЧТО ТАКОЕ ЭНЦЕФАЛИТ?

**Энцефалит** – вирусное природно-очаговое заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Источниками вируса являются более 100 видов животных – крупный рогатый скот, птицы, грызуны и др.

## ПЕРЕНОСЧИКИ ВИРУСА



Вирус в крови сохраняется в течение 3-25 мм

**Среда обитания:** в лесах, на полянках, в парках и других местах, где имеется трава и кусты.

**Активность:** теплые времена года, с апреля по октябрь, пик активности – июнь-июль.

**Как нападает:**

Клещ незаметно впивается в кожу жертвы, выделяет со слюной анестезирующее и разжижающее кровь вещество, обеспечивающее процесс присасывания. Человек может длительное время не ощущать прикрепившегося клеща. Через несколько часов после укуса голова насекомого полностью погружается под кожу человека, а брюшко раздувается от выпитой крови.



Вирус сохраняется в течение всей жизни клеща!

## ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- Инкубационный период** длится 1,5 - 2 недели.
- Поражение коры головного мозга** длится несколько дней.
- Воспаление мозга** Симптомы: головные боли, рвота, потеря сознания (лежать до комы), температура тела 39-40°.



## ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УКУСЕ КЛЕЩА

- Используйте нить для извлечения клеща** Прочную нитку завяжите в узел как можно ближе к хоботку клеща, затем извлеките клеща, медленно раскачивая и подтягивая его вверх.
- Если на коже осталась черная точка** Во время извлечения клеща оторвалась его голова или хоботок. Обработайте место укуса спиртом или 5% раствором йода и, затем, удалите головку стерильной иголкой (предварительно прокаленной на огне) также, как удалили обычную занозу.
- Дезинфицируйте место укуса** Как можно быстрее обработайте место укуса клеща любым дезинфицирующим средством – 3-5% раствором зеленки, 5% раствором йода, спиртом и т.п.
- Тщательно вымойте руки с мылом**
- Обратитесь к врачу** Клеща необходимо исследовать на наличие инфекции. Поместите клеща в стеклянный флакон вместе с слюной на кусочке чистой ваты, плотно закройте крышечку. Храните в холодильнике не более 2 суток.



**Что делать НЕЛЬЗЯ!**  
 Брать клеща голыми руками, раздвигать!  
 Делать резкие движения – клещ разорвется!  
 Импализовать место – он закупорит дыхательные отверстия, и клещ может умереть, так и оставшись в коже!